

Service d'anesthésie
Hôpital Bonnet
240 Avenue Saint Lambert
83600 Fréjus
Secrétariat : 04 94 40 21 61

A Fréjus le

Etiquette patient

ORDONNANCE TYPE APRES CHOC ANAPHYLACTIQUE/ANAPHYLACTOÏDE AU BLOC OPERATOIRE

(Pour chaque série de prélèvement, descendre une ordonnance type avec les tubes. Soit, au total, 3 ordonnances types par patient. Il faut donc transférer le patient en USC ou réanimation avec 1 ou 2 ordonnances types. Préciser lors de la relève si certains prélèvements n'ont pas été réalisés aux heures prévues)

Dans les 30 minutes :

- 1 EDTA (mauve) : histamine
- 1 tube sec : tryptase
- 1 tube sec : IgE anti-AQ

Entre 1 et 2 heures après le choc :

- 1 tube sec : tryptase
- **Ou** 3 tubes (si histamine et IgE anti-AQ non prélevés dans les 30 minutes) :
 - 1 EDTA (mauve) : histamine
 - 1 tube sec : tryptase
 - 1 tube sec : IgE anti-AQ

A la 24^{ème} heure :

- 1 tube sec : tryptase
- **Ou** 2 tubes (si IgE anti-AQ non prélevé auparavant) :
 - 1 tube sec : tryptase
 - 1 tube sec : IgE anti-AQ

**Les prélèvements doivent être descendus immédiatement
au laboratoire pour centrifugation et congélation.**

Signature médecin